

ICS 11.020  
C 60



# 中华人民共和国国家标准

GB 16376—1996

## 棉尘病诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and principles of  
management of byssinosis

1996-05-23发布

1996-12-01实施

国家技术监督局  
中华人民共和国卫生部 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 棉尘病诊断标准及处理原则

GB 16376—1996

Diagnostic criteria and principles of  
management of byssinosis

棉尘病是由于长期接触棉、麻等植物性粉尘引起的、具有特征性的胸部紧束感和/或胸闷、气短等症状，并有急性通气功能下降的呼吸道阻塞性疾病。长期反复发作可致慢性通气功能损害。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了棉尘病的诊断标准及处理原则。

本标准适用于棉尘病的诊断及处理。

### 2 诊断原则

根据长期接触棉、麻等植物性粉尘的职业史，具有特征性呼吸系统症状和急性或慢性肺通气功能损害，结合现场劳动卫生情况调查，排除吸烟等其他原因引起的阻塞性呼吸系统疾病，方可诊断。

### 3 诊断及分级标准

#### 3.1 观察对象

偶尔有胸部紧束感和/或胸闷、气短等特征性呼吸系统症状，出现第一秒用力肺活量  $FEV_{1.0}$  下降，但工作班后与班前比较下降幅度不超过 10%。

#### 3.2 棉尘病Ⅰ级

经常出现工休后工作第一天或工作周内几天均发生胸部紧束感和/或胸闷、气短等特征性的呼吸系统症状。 $FEV_{1.0}$  班后与班前比较下降 10% 以上。

#### 3.3 棉尘病Ⅱ级

呼吸系统症状持续加重，并伴有慢性通气功能损害， $FEV_{1.0}$  或用力肺活量 FVC 小于预计值的 80%。

### 4 治疗原则

按阻塞性呼吸系统疾病治疗原则，以对症治疗为主。

### 5 劳动能力鉴定

#### 5.1 观察对象应定期作健康检查，以观察病情变化。

#### 5.2 棉尘病Ⅰ级患者应进行对症治疗，必要时调离粉尘作业。

#### 5.3 棉尘病Ⅱ级患者应调离接触棉、麻等植物性粉尘的工作，并进行对症治疗。

### 6 健康检查的要求

就业前应作体检，就业后应每 2~3 年体检一次。除按常规作内科体检外，还必须按统一症状询问表逐项登记，同时作肺通气功能测定。