

UDC 616-057 : 616-07/-08 : 616.24
C 60



中华人民共和国国家标准

GB 8783—88

尘肺病理诊断标准

Pathologic diagnostic criteria of pneumoconioses

1988-02-22 发布

1988-09-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

尘肺病理诊断标准

Pathologic diagnostic criteria of pneumoconioses

尘肺系指在生产活动中吸入粉尘而发生的肺组织纤维化为主的疾病。

1 诊断原则

根据详细可靠的职业史及规范化的检查方法得出的病理检查结果方可做出尘肺的病理诊断。患者历次 X 线胸片、病例摘要或死亡志及现场劳动卫生学资料是诊断的必需参考条件。

2 诊断分期标准

2.1 无尘肺

仅见有肺及肺引流区淋巴结出现粉尘反应；或肺及肺引流区淋巴结出现尘肺病变，其范围及严重程度不够诊断为 I 期尘肺。

2.2 I 期尘肺

a. 全肺各切面眼观及镜检尘肺结节总数在 20 个以上；或 10 个以上，伴接近 1 级/1 度弥漫性肺纤维化。

b. 尘性弥漫性肺纤维化 1 级/1 度以上。

c. 全肺尘斑 - 气肿面积占 50% 以上。

2.3 II 期尘肺

a. 全肺各切面眼观及镜检尘肺结节总数在 50 个以上；或 20 个以上，伴 1 级/1 度以上弥漫性肺纤维化。

b. 尘性弥漫性肺纤维化 2 级/2 度以上。

c. 全肺尘斑 - 气肿面积占 75% 以上。

2.4 III 期尘肺

a. 肺内出现尘性块状纤维化，并伴有 I 期以上尘肺病变基础。

b. 尘性弥漫性肺纤维化 3 级/3 度以上。

病变符合上述各期中 a 或 b 或 c 者可做出分期诊断。