



# 中华人民共和国卫生行业标准

WS 236—2003

---

## 生殖器疱疹诊断及处理原则

Diagnostic criteria and principles of management of genital herpes

2003-06-27 发布

2004-01-01 实施

---

中华人民共和国卫生部 发布

## 前 言

本标准第 2 章为强制性,其余为推荐性。

生殖器疱疹是一种常见性病,由单纯疱疹病毒(herpes simplex virus, HSV)感染所引起,容易复发。近年来,该病在我国的发病率迅速上升,成为最常见的性病之一。为了对生殖器疱疹患者提供可靠的诊断,进行合适的治疗,以及了解我国生殖器疱疹的流行状况和流行趋势,为防治工作提供可靠的依据,特制定本标准。

在制定本标准的过程中,认真研究了我国卫生部于 2000 年 8 月颁布的《性病诊疗规范和性病治疗推荐方案》,参阅了美国疾病控制和预防中心(CDC)于 1996 年 9 月修订的生殖器疱疹诊断标准,以及美国疾病控制和预防中心新近公布的《性传播疾病治疗指南》(1998 年)的相关部分。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准的附录 B 为资料性附录。

本标准由卫生部疾病控制司提出。

本标准起草单位:中国医学科学院皮肤病研究所、全国性病麻风病控制中心。

本标准主要起草人:赖伟红、邵长庚。

本标准由卫生部委托卫生部传染病防治监督管理办公室负责解释。

## 生殖器疱疹诊断标准及处理原则

### 1 范围

本标准规定了生殖器疱疹的诊断标准及处理原则。

本标准适用于全国各级性病防治机构、医疗保健机构和卫生防疫机构。

### 2 诊断标准

#### 2.1 接触史

有非婚性接触史或配偶感染史。

#### 2.2 临床表现

2.2.1 主要分为原发性和复发性两种临床类型。

##### 2.2.2 原发性生殖器疱疹

2.2.2.1 潜伏期 2 d~20 d(平均 6 d)。

2.2.2.2 外生殖器或肛门周围有集簇的或散在的小水疱,2 d~4 d 后破溃形成糜烂或溃疡,自觉疼痛。

2.2.2.3 腹股沟淋巴结肿大,有压痛。

2.2.2.4 常常伴有发热、头痛、乏力等全身症状。

2.2.2.5 病程约 2 周~3 周。

2.2.2.6 以往从无类似发作史。

##### 2.2.3 复发性生殖器疱疹

2.2.3.1 原发皮损消退后,皮疹可反复发作。与原发性生殖器疱疹相比,复发性生殖器疱疹的局部症状和皮损轻微,腹股沟淋巴结肿大少见,全身症状少见,病程较短。

2.2.3.2 起皮疹前,局部有烧灼感、针刺感或感觉异常等前驱症状。

2.2.3.3 外生殖器或肛门周围有集簇的小水疱,很快破溃形成糜烂或浅表溃疡,自觉症状较轻。

2.2.3.4 病程约 1 周~2 周。

2.2.3.5 以往曾有过类似发作史。

#### 2.3 实验室检查

2.3.1 细胞学检查(Tzanck 涂片) 以玻片在水疱或溃疡基底部分作印片,瑞特染色或姬姆萨染色,显微镜下可见到具有特征性的多核巨细胞或核内病毒包涵体。

2.3.2 病毒抗原检测 从皮损处取标本,以单克隆抗体免疫荧光试验(IFA)或酶联免疫吸附试验(ELISA)检测单纯疱疹病毒抗原。

2.3.3 病毒培养 从皮损处取标本作病毒分离培养,发现有单纯疱疹病毒引起的特征性细胞病变。

#### 2.4 病例分类

2.4.1 临床诊断病例 具备 2.1 和 2.2 指标。

2.4.2 确诊病例 除了具备 2.1 和 2.2 指标外,还具备 2.3 指标中的任何一项。

### 3 处理原则

#### 3.1 治疗原则

及时足量使用抗病毒药物,以减轻症状、缩短病程和控制疾病的传染与复发。

#### 3.2 临床治愈标准

生殖器疱疹是一种不可治愈的病毒性疾病。治疗后,患处皮损完全消退,疼痛、感觉异常及淋巴结