

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 361—1999

腰果 种子

Cashew seeds

1999-04-07 发布

1999-07-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业
行业标准
腰果种子

NY/T 361—1999

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 9 千字

1999年8月第一版 1999年8月第一次印刷

印数 1—600

*

书号: 155066·2-12658

*

标 目 382—59

前 言

腰果种子标准的制定是热带作物种子种苗标准化工作的一个组成部分。

本标准的制定,将有助于实现腰果种子的标准化生产,对加强与国外的友好合作,推动腰果生产的发展将起到积极作用。

本标准的附录 A、附录 B 是标准的附录。

本标准由农业部市场与经济信息司提出。

本标准由农业部热带作物及制品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国热带农业科学院热带园艺研究所。

本标准主要起草人:邓穗生、江式邦。

本标准委托中国热带农业科学院热带园艺研究所负责解释。

中华人民共和国农业行业标准

腰果 种子

NY/T 361—1999

Cashew seeds

1 范围

本标准规定了用于育种的腰果(*Anacardium occidentale* L.)种子的定义、各级别的质量指标、检验、包装、标志、贮存和运输方法。

本标准适用于育种的腰果种子的质量鉴定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 3543.1~3543.7—1995 农作物种子检验规程

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 浮水率

将育成的净种子放入干净水中,浮在水面的种子数占供检种子数的百分率。

3.2 破损率

凡外果皮因人为、机械或病虫害而损伤的种子数占供检种子数的百分率。

3.3 畸形率

在未破损的净种子中,种子外观形状具明显异常或明显不规则的种子数占供检种子数的百分率。

4 腰果种子质量分级指标及要求

4.1 腰果种子质量分级指标

腰果种子质量分级指标见表1。

表1 腰果种子分级指标

项目 级别	发芽率 %	百粒重 g	浮水率 %	破损率 %	畸形率 %	含水率 %	净度 %
一级	≥95	≥570	≤5	≤2	≤2	≤7	≥99.5
二级	≥90	≥500	≤10	≤5	≤5	≤7	≥99.5
三级	≥85	≥420	≤15	≤10	≤10	≤7	≥99.5

4.2 腰果种子质量分级要求

4.2.1 腰果种子质量分级以发芽率、百粒重、浮水率和破损率为依据,其中以发芽率为主要定级标准。

4.2.2 当百粒重、浮水率和破损率三项指标中任两项级别比发芽率高二级,另一项比发芽率高一级或

中华人民共和国农业部 1999-04-07 批准

1999-07-01 实施