

江苏省地方标准

DB32/T 3532—2019

锦带花乔木化育苗技术规程

Technical regulation of arborization cultivation for *Weigela florida*

2019-02-28 发布

2019-03-30 实施

江苏省市场监督管理局 发布

江苏省地方标准
锦带花乔木化育苗技术规程

DB32/T 3532—2019

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2019年4月第一版

*

书号: 155066·5-0902

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江苏农林职业技术学院提出并归口。

本标准起草单位：江苏农林职业技术学院、句容仑山花木场。

本标准主要起草人：邱国金、崔舜、钱阳升、蒋小庚、胡卫霞、孙其松、于敏、钱之华。

锦带花乔木化育苗技术规程

1 范围

本标准规定了锦带花(*Weigela florida*)乔木化育苗技术规程的术语和定义、育苗、乔木化育苗及苗木出圃。

本标准适用于锦带花乔木化培育。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

乔木化 arborization

将灌木培育成主干高度 2.0 m 以上且有分枝的小乔木。

3 育苗

3.1 母株培养

冬春季节,剪除母株上已开花的老枝,对 1 年生枝条在基部留 3~4 节短截,剪后在离树丛外围 30 cm 左右挖宽 20 cm、深 30 cm 的环状施肥沟,每株施氮磷钾(15:15:15)复合肥 150 g~200 g 后覆土。5 月中旬,摘除嫩枝上的花蕾,剪除基部细弱的嫩枝。

3.2 苗床准备

采用塑料大棚或小拱棚扦插育苗,选用蛭石、珍珠岩、泥炭配比为 1:1:1 的扦插基质,厚度 20 cm~25 cm;插前用 0.5%高锰酸钾液消毒 1 d。小拱棚用竹板做成宽 2 m、高 1 m 的弓形架,插进预先整好的圃地中,间距 50 cm。

3.3 穗条采集

6 月下旬剪取半木质化的枝条,将穗条剪成长约 10 cm~15 cm 的插穗,保留顶部 2 片叶并剪去 1/2,下部叶片全部剪掉,上剪口距上芽 1 cm 平剪,下剪口在芽背面斜剪。

3.4 插穗处理

插穗捆好后基部墩齐,将基部 3 cm 浸入 0.1%氯化汞溶液 30 s 左右后再浸入 500 mg/L 萘乙酸溶液中 5 s 左右,取出晾干后扦插。

3.5 扦插方法

扦插前用比插穗稍粗的木棍打孔,将处理过的插穗直接插入基质内压实。扦插密度以叶片互不重叠,插后浇一次透水。用透光度 50%的遮阳网遮阴。

3.6 插后管理

插后 20 d 内棚内湿度保持在 80%以上,温度保持在 20℃~30℃,20 d~25 d 早晚撤去遮阳网,每