


UDC 677.3
W 20



中华人民共和国国家标准

GB/T 14269—93

羊毛试验取样方法

The sampling methods for wool testing

1993-04-02发布

1993-07-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

羊毛试验取样方法

GB/T 14269—93

The sampling methods for wool testing

1 主题内容与适用范围

本标准规定了原毛和洗净毛的批样、试验室样品、试验样品和试验试样的抽取方法。
本标准适用于国产绵羊毛。

2 引用标准

GB 1523 绵羊毛
GB 6097 棉纤维试验取样方法
GB 6500 羊毛回潮率试验方法 烘箱法
GB 6976 羊毛毛丛自然长度试验方法
GB 6978 原毛洗净率试验方法 烘箱法
GB/T 14271 原毛净毛率试验方法 油压法

3 术语

3.1 批样 sample, lot

从一个范围内所抽取的一个相对大的样品。

3.2 试验室样品 laboratory sample

从原毛批样或洗净毛批样中分别制备的代表性样品。供抽取试验样品之用。

3.3 试验样品 test sample

从批样或试验室样品中抽取的用于一个测试项目的样品，应具有代表性，并有转变为试验试样的足够的量。

3.4 试验试样 test specimen

从试验样品中取出的用于一次试验的试样。

3.5 多点法 more point method

将充分混合后的批样或试验室样品，平铺为薄厚均匀的毛层，从 16 个分布大致均匀的区域，随机从毛层正反两面 32 个点的部位抽取样品的方法。

3.6 对分减半法 reduce by half methods for fifty-fifty part

经充分混合后的批样，薄厚均匀地平铺在试验台上，使成方形，用对角线分作四份，每份一组，并等分，舍去左半部，再将右半部分为二舍去左半部，如此不断减半至所需的重量，然后合并各组取得样品的方法。

4 方法概述

从毛包中扦取批样，从批样中抽取试验室样品，从试验室样品中抽取试验样品，从试验样品中抽取试验试样。在这些步骤中必须保持被试验羊毛的代表性。