

**YC**

# **中华人民共和国烟草行业标准**

**YC/T 145. 6—1998**

---

## **烟用香精 香气质量通用评定方法**

**Tobacco flavor—General method for evaluation of odor quality**

1998-03-12发布

1998-05-01实施

**国家烟草专卖局发布**

## 前　　言

本标准为烟草用香精香气质量的评定提供了一种通用方法。本标准在制定过程中参考了GB/T 14454.2—93《香料 香气评定法》、GB/T 3358.1～3358.3—93《统计学术语》、GB/T 10220—88《感官分析方法总论》等国家标准，并与其保持了较好的协调性。

本系列标准包括：

- YC/T 145.1—1998 烟用香精 酸值的测定
- YC/T 145.2—1998 烟用香精 相对密度的测定
- YC/T 145.3—1998 烟用香精 折光指数的测定
- YC/T 145.4—1998 烟用香精 乙醇中溶混度的评估
- YC/T 145.5—1998 烟用香精 澄清度的评估
- YC/T 145.6—1998 烟用香精 香气质量通用评定方法
- YC/T 145.7—1998 烟用香精 标准样品的确定和保存
- YC/T 145.8—1998 烟用香精 香味质量通用评定方法
- YC/T 145.9—1998 烟用香精 挥发性成分总量通用检测方法

本标准从1998年5月1日起实施。

本标准的附录A为标准的附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国烟草总公司郑州烟草研究院。

本标准主要起草人：谢剑平、胡清源、罗丽娜、胡军。

# 中华人民共和国烟草行业标准

## 烟用香精 香气质量通用评定方法

YC/T 145. 6—1998

Tobacco flavor—General method for evaluation of odor quality

### 1 范围

本标准规定了评定烟用香精香气质量的方法。

本标准适用于烟用香精。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14455. 2—1993 精油 取样方法

GB 4086. 1~4086. 6—83 统计分布数值表

YC/T 145. 7—1998 烟用香精 标准样品的确定和保存

### 3 原理

用三点检验法,通过嗅觉评香,评定试样的香气质量(包括香型、香气浓淡、强弱、持久性、杂气)是否与标准样品一致。

### 4 标准样品和辨香纸

#### 4. 1 标准样品

参见 YC/T 145. 7。

#### 4. 2 辨香纸

无异味的吸水纸,厚度约 0. 5 mm,宽 5~10 mm,长 100~150 mm。

### 5 评定方法和步骤

#### 5. 1 评定方法

采用三点检验法,评定试样与标样的香气质量(包括香型、香气浓淡、强弱、持久性、杂气)是否一致。

##### 5. 1. 1 评价员

三点检验需要的评价员数量:6 个以上具有相应资格的评价员。在条件许可时,也可由 15 个以上精选的评价员;或 25 个以上一般的评价员组成。

##### 5. 1. 2 检测要求

为评价员准备一组三个编码的试样,其中两个是相同的,要求评价员挑出单零的那个。三个不同排列次序的样品组中,二种样品出现的次数应相等,它们是: